

BIOS RadicalFluid

Concime CE - Concime fluido composto

Convenzionale

N	P	K	U.F.
10	34	0	44

BIOS RadicalFluid è un concime liquido appositamente studiato per fornire alle colture **Azoto** e **Fosforo** in forma perfettamente e immediatamente assimilabile, per stimolare la radicazione, la germinazione e lo sviluppo vegetale.

BIOS RadicalFluid è indicato per applicazioni radicali come effetto starter e per terreni dotati di potassio.

Può essere usato per via fogliare (in caso di intervento di soccorso) per fornire fosforo prontamente assimilabile.

BIOS RadicalFluid: è la giusta soluzione per una partenza impeccabile!

COMPOSIZIONE

Azoto	(N) totale	10 %
di cui: Azoto	(N) ammoniacale	10 %
Anidride fosforica	(P ₂ O ₅) solubile in acqua	34 %



CONFEZIONI

Cartone	(Flaconi Pz. 20 x Kg.1)
Taniche	Kg. 8 - 15 - 30 - 1.300
Forma fisica	Liquido

Temperatura di immagazzinamento: >=4° <=25°. Non esporre il contenitore a raggi solari diretti. Il prodotto non è combustibile, ed è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.



Restrizioni dell'uso - Art. 11, paragrafo 1, lettera c) del Reg. CE/1069/2009: L'alimentazione di animali d'allevamento con piante erbacee, assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte, provenienti da terreni sui quali sono stati applicati fertilizzanti organici o ammendanti diversi dallo stallatico, a meno che il pascolo o il taglio dell'erba abbiano luogo alla scadenza di un periodo di attesa, di almeno 21 giorni, volto a garantire un adeguato controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali.



I dati analitici indicati sulle confezioni seguono le prescrizioni del D.Lgs n. 75 del 29/04/2010 e successive modifiche e/o integrazioni. Tutti i dati riportati nella presente pubblicazione sono indicativi, BIOS s.r.l. si riserva il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso.

MATERIE PRIME

COMPONENTI MINERALI

Soluzione di concimi NP



DOSI CONSIGLIATE

Fertirrigazione

da Kg. 15 a Kg. 60 per somministrazione/Ha

Fogliare

da Kg. 3 a Kg. 6 per somministrazione/Ha

Quantità minima: per somministrazioni ripetute durante il ciclo colturale, per via fogliare può essere miscelata con agrofarmaci.

Quantità massima: effetto starter, in tal caso il prodotto va utilizzato da solo.

Le dosi consigliate hanno valore indicativo, dovranno essere aumentate e/o diminuite tenendo in considerazione: le caratteristiche pedoclimatiche della zona d'interesse, fertilità, ritenzione idrica, struttura del terreno, varietà colturale, l'attrezzatura utilizzata e l'esperienza dell'imprenditore agricolo. In ogni caso si raccomanda di evitare concentrazioni del prodotto vicino al seme e/o alle radici.